stellt. Es zeigen sich Unterschiede in der Ernährung dieser Arten (Fig. 1). Eine eingehendere Diskussion kann erst nach weiteren Untersuchungen folgen.

LITERATURVERZEICHNIS

BURCKHARDT, D. 1959. *Über die biologischen Ursachen der Wildschäden im Wald.* Schw. Zeitschr. f. Forstwesen 9: 598-616.

DUSI, J. L. 1949. *Methods of determination of food habits by plant microtechniques and histology and their application to Cottontail Rabbit food habits.* Journal of Wildlife Management 13: 295-298.

JENSEN, P. V. 1958. *Panseninhalt dänischen Rotwildes.* Zeitschr. f. Jagdwissenschaft 4: 164-167.

METCALFE, C. R. 1960. *Anatomy of the monocotyledons, I: Gramineae.* Oxford, at the Clarendon Press.

MUNTHE-KAAS, H. 1959. *Die Winternahrung des Hasen in Norwegen.* Vortrag an der 4. Tagung der Wildbiologen in Arnhem.

TENER, J. S. 1954. *A preliminary Study of the Musk-oxen of Fosheim Peninsula, Ellesmere Island, NWT.* Wildlife Management Bull. Ser. 1, Nr. 9. Canadian wildlife service.

N° 13. **A. Meylan,** Lausanne. — Insectivores et Rongeurs dans la région de Bretolet. (Résumé.)

Laboratoire de Zoologie et d'Anatomie comparée, Université de Lausanne.

Durant les étés 1959 et 1960, un certain nombre de piégeages ont été effectués dans la région s'étendant du Col de Bretolet (alt. 1923 m) à Barme (alt. 1489 m) au-dessus de Champéry dans les Alpes valaisannes. Les Micromammifères capturés, ainsi que quelques spécimens trouvés morts en 1958, se rattachent aux espèces suivantes.

Insectivores:

Talpa europaea europaea Linné, 1758.
Sorex minutus minutus Linné, 1766.
Sorex araneus tetragonurus Hermann, 1780.
Sorex alpinus alpinus Schinz, 1837.
Neomys fodiens fodiens Pennant, 1771.

Rongeurs:

Eliomys quercinus quercinus Linné, 1766.
Muscardinus avellanarius avellanarius Linné, 1758.
Apodemus flavicollis flavicollis Melchior, 1834.
Clethrionomys glareolus nageri Schinz, 1845.
Pitymys multiplex Fatio, 1905.
Microtus nivalis nivalis Martins, 1842.
Microtus arvalis arvalis Pallas, 1779.
Microtus agrestis levernedii Crespon, 1844.

Le travail paraîtra dans le *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles.*

N° 14. **J. Bovet.** — Quelques particularités de l'anatomie de *Diplozoon paradoxum* v. Nordmann 1832.

Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel. Directeur: Professeur Jean G. Baer.

Diplozoon paradoxum est un Ver Monogène parasite de divers Cyprinidés. Dans le Lac de Neuchâtel, nous le trouvons sur la Brême *(Abramis brama)* et le Gardon ou Vangeron (nom vernaculaire) *(Leuciscus rutilus)*. Il est fixé au tissu branchial et se nourrit aux dépens du sang de son hôte.

Son nom générique de *Diplozoon* (double animal) provient du fait qu'au stade adulte, il se trouve invariablement soudé à un autre individu, à tel point que le couple qui en résulte n'a plus la possibilité de se désunir.